N°. 44. Observation

sur une hernie ventrale

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Un carosse dont les chevaux avoient —
pris le mord-aux dents, passa sur le corps
d'un homme agé d'environ trente ans

Un homme agé d'environ trente ans fut
renversé par un carosse dont les chevaux avoient
pris le mordaux dents. La Roüe lui ~~prit le~~
~~corps en angle droit~~ passa directement sur le ventre de
gauche adroite precisement entre la derniere
des fausses cotes et la crete de l'os des illes. Le
blessé sentit aussitost de vives douleurs dans tout
le bas ventre. on le saigna plusieurs fois du
bras; on fit les fomentations convenables —
pour s'opposer a l'inflammation; mais —
malgré ces secours le malade mourut le
quatrieme jour. ~~j'eus occasion de fai~~
J'eus occasion de faire l'ouverture du —
cadavre et je trouvai une grande inflamma=
=tion dans les visceres du bas ventre, beaucoup
de sang infiltré du coté gauche dans la —
membrane adipeuse qui entoure le rein,
et du coté droit une hernie ventrale vers la.

ARC 16 d 21 n°61

partie posterieure de la region lombaire.
cette hernie etoit formée par une circonvolution de l'intestin —
ileon d'environ quatre ou cinq pouces, et qui netoit recouverte que de la peau et
de la graisse. il y avoit une rupture au —
peritoine atravers de la quelle ~~sortoit~~ passoit l'intestin
dans l'angle que font le grand et le petit —
oblique en ~~dont les plans de fibres~~ se croisant
posterieurement. ~~l'inter~~ l'ileon etoit etranglé,
et fort gonflé de vents, ~~mais~~ il n'étoit cependant point
encore ny considerablement enflammé, ny —
livide; ~~ce qui pourroit faire presumer que la~~
~~hernie n'a pas beaucoup contribué a la mort~~
~~du malade~~. ~~ne doute~~
personne n'ignore que les pressions —
violentes et subites ~~ne puissent~~ peuvent produire
des hernies ventrales; ~~on scait encore~~ que dans
ces cas il y a presque toujours rupture au
peritoine, ~~et par consequent~~ que [illegible] les parties ~~qui~~
~~font la hernie~~ deplacées se trouvent immediatement
sous la graisse ou sous les muscles, quoique ces sortes de hernies doivent etre
operées avec encore plus de precaution que les —
autres. ~~[illegible]~~ ces consequences seroient trop com=
=munes pour fonder l'utilité d'une observation
mais ce qui ~~[illegible]~~ paroit important ~~de remarquer~~
dans le fait ~~qui vient d'etre~~ raporté, c'est —

L'assemblage des circonstances les plus capables d'en imposer et de ~~[illegible]~~ faire méconnoitre dans un cas semblable ~~la~~ hernie. en effet on ~~ne~~ ~~dans~~ croit communement que les hernies ventrales ne ~~peut~~ peuvent avoir leur siege qu'aux parties anterieures du bas ventre. La region posterieure fortifiée d'os et de muscles epais semble en estre a l'abri, excepté dans les cas ou le peritoine et les muscles sont divisés par quelque playe, ou en consequence de quelques abcès. Le peritoine ne souffre et dans les efforts de distention, d'allongement ou de rupture qu'autant qu'il cesse d'estre suffisament soutenu par les muscles qui le recouvrent; il faut donc que les muscles eux même prêtent ou souffrent une rupture en même temps que le peritoine, pour qu'il y ait une hernie ventrale. et comme lorsque cette ~~[illegible]~~ hernie ~~ventrale~~ arrive tout a coup elle ~~[illegible]~~ ne peut se faire par dilatation ou allongement du peritoine ce qui supposeroit ~~une pression~~, un effort, une pression douce, lente et graduée, ou du moins plusieurs petits efforts repetés, il s'ensuit qu'[illegible] la rupture ~~arrivant~~ ~~[illegible]~~ au peritoine toutes les fois que la cause d'une hernie ventrale sera subite et violente, la rupture devroit se faire aussi aux muscles, puisque comme on l'a dit cy dessus le peritoine ne peut evidamment ceder soit pour ~~[illegible]~~ allongement et dilatation, soit pour rupture, qu'autant que les muscles cesseront de le soutenir.

Scavoir si on a vu des hernies ventrales en consequence d'une cause violente et subite, par consequent avec rupture du peritoine, et qui ait eté sans rupture des muscles ~~complette~~.

La hernie etoit Dailleurs située Dans un lieu, ou un volume considerable de parties peut seloger sans faire une tumeur fort sensible. troisiemement La tumeur eut elle été apparante, on pouvoit La regarder comme etant de même nature ~~et produite~~ que La tumeur du coté gauche, d'autant plus que La même cause, c'est a dire La Roüe Du carosse, a passé également sur ces deux cotés. quatriemement L'epaisseur des teguments en cet endroit empeche de distinguer au tact ce qui forme La tumeur. ~~Le~~ Cinquiemement Les autres signes qui se tirent de La hernie même, comme La douleur La tention sont communs aux fortes contusions et aux tumeurs inflammatoires; il n'y auroit precisement que Le gargouillement que Le malade sentiroit ~~lui~~ même dans sa tumeur, ou que Le chirurgien appercevroit en touchant, qui put faire distinguer cette tumeur, mais ce gargouillement ne se fait plus sentir Lorsque L'etranglement est considerable, comme il doit L'etre aprés Le premier jour, même quelques heures aprés L'accident, temps auquel La tumeur pourroit se manifester assez pour engager Le chirurgien a quelques recherches. a L'égard des autres simptomes de La hernie etranglée tels que Les Douleurs violentes dans Le bas ventre, Les choliques, Les vomissements La tension du ventre, tous ces simptomes sont dans un cas semblable tres equivoques, puisqu'ils peuvent dependre egalement de L'inflammation du bas ventre, cause qui doit veritablement exciter a la suite de

de pressions et de contusions aussi violentes que celles que doit faire La roüe d'un carosse en passant sur Le ventre. tout, comme on L'a avancé, eloigne donc dans de pareilles circonstances L'idée d'une hernie ventrale au lieu designé. il peut donc arriver qu'aprés avoir dompté par des saignées, des fomentations et autres remedes, L'inflammation et des contusions interieures et exterieures, Le malade meure en consequence d'une hernie etranglée. ou plustost il peut arriver que ~~L~~ L'etranglement de la hernie entretenant L'inflammation on ne pourra La dompter par Les remedes Les plus propres. ~~mais prevenu~~ et Le malade mourra d'une gangrene au bas ventre; mais prevenu de La possibilité d'une hernie ventrale au lieu designé, on tachera de La connoitre par ses signes, qui malgré L'equivoque que nous avons d'abord exposé, ne seront pas impossible a démeler. s'informer surtout de quel coté La roüe a passé. car d'un homme ivre &c.

au reste cette observation est d'autant plus utile que Le lieu par Lequel cette hernie s'etoit faite parroit affecté dans Le cas des effort tels que celui dont il s'agit. en effet La roüe en passant, sur Le ventre pousse Les intestins de ce coté

Lieu ou aboutissent Les tranchées et Le cholique.